Etapas de la enfermedad de Lyme

- **Temprana:** Localizada en los primeros días o semanas.

- **Diseminación temprana:** Han transcurrido varias semanas o meses. La bacteria comienza a propagarse por todo el cuerpo.

- **Diseminada / Persistente tardía:** Etapa final de la enfermedad. Pasaron meses o incluso años. Los síntomas pueden ser graves: artritis crónica, síntomas cardiacos y neurológicos importantes.

¿Cómo protegerse?

- Utilice repelente en actividades al aire libre.
- Revise su cuerpo de picaduras extrañas.
- Cuide sus mascotas llevándolas al veterinario.

Fuentes

- (2022, September 11). Enfermedad de Lyme: MedlinePlus en español. Medlineplus. https://medlineplus.gov/spanish/lymedisease.html
- (2022, September 11). Garrapatas de venado: Todo lo que debes saber al respecto. Hablemosdeinsectos. https://hablemosdeinsectos.com/garrapatas-de-venado/
- Delgado Cidranes, Prof. Ernesto. (2019, May 21). ¿Cuáles son las etapas de la enfermedad de Lyme? - Dolor. Dolor-drdelgadocidranes. https://dolor-drdelgadocidranes.com/cuales-son-las-etapas-de-la-enfermedad-de-lyme/
- (2018, December 21). Signos y síntomas de la enfermedad de Lyme sin tratar | Lyme Disease | CDC. Cdc. https://www.cdc.gov/lyme/es/signs_symptoms/index.html
- Castillero Mimenza, O. (2018, January 2). Enfermedad de Lyme: síntomas, causas y tratamiento. Psicologiaymente. https://psicologiaymente.com/clinica/enfermedad-de-lyme
- Sprong, H., Azagi, T., Hoornstra, D., Nijhof, Ard M.., Knorr, S., Baarsma, M. Ewoud. & Hovius, Joppe W.. (2018). Control de la borreliosis de Lyme y otras enfermedades transmitidas por Ixodes ricinus. National Library of Medicine, 29510749. 10.1186/s13071-018-2744-5

Hecho con amor por Taurino González

Enfermedad de Lyme

¿Tienes dolor de cabeza intenso, fiebre, mareos o malestar general?

Conoce la enfermedad de Lyme o de la gran imitadora.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Es una enfermedad causada por bacterias como Borrelia Burgdorferi, Babesias, entre otras, transmitidas por la picadura de una garrapata.



Ciclo de vida de la garrapata.

Para contraer la enfermedad, la garrapata debe adherirse a su cuerpo de 36 a 48 h.

En humanos se sitúa en áreas poco visibles; axilas, detrás de las orejas, cuero cabelludo, la ingle, el ombligo, detrás de las rodillas, etc.

Principales síntomas

- Sarpullido rojo o lesión cutánea indolora (eritema migratorio).
- Dolor de cabeza intenso.
- Escalofríos.
- Fiebre.
- Dolores musculares y/o articulares.



Lesión cutánea que aparece los primeros días después de la picadura de garrapata.

Es conocida como la enfermedad de la gran imitadora porque puede confundirse con la gripe, depresión u otro padecimiento.

¿Cuándo visitar a un médico?

Si presenta los síntomas luego de una actividad al aire libre, tener contacto con mascotas desatendidas, ver una garrapata en su hogar o adherida* a su cuerpo o el de su mascota*.

* No intente retirarla por sus propios medios, quemarla o aplastarla. Acuda de inmediato a un centro de salud.

Tamaño real de una garrapata. De izquierda a derecha: larva, ninfa y adulta

Para confirmar el diagnóstico es necesario realizarse algunos estudios: Examen ELISA o Tick Borne Encephalitis (TBEV).

Después iniciará un tratamiento con antibióticos. El tipo, dosis y periodo dependerán de la valoración de su médico.